

	SINTESI INFORMATIVA SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE	Rev.0.0 21/09/2021 Pagina 1 di 1
--	--	--

La scintigrafia polmonare trova applicazione nella diagnosi e follow-up della Trombo Embolia Polmonare (TEP), nella valutazione preoperatoria di Pneumonectomia.

Preparazione all'esame

Non è necessaria alcuna preparazione ed è consentito fare colazione.
Non è necessario sospendere i farmaci.

Cosa deve portare il paziente

Gli esami eseguiti (in particolare scintigrafie precedenti, Radiografie o TAC), eventuali visite specialistiche ed ogni altra documentazione clinica utile ad un corretto inquadramento del quesito diagnostico.

Modalità di effettuazione dell'esame

La somministrazione del radiofarmaco avviene per via endovenosa, con paziente già posizionato sul lettino della gamma-camera: dopo pochi minuti dalla somministrazione viene eseguita la scintigrafia (durata dell'esame circa 15-20 minuti).

Per l'intera durata dell'esame dovrà rimanere fermo con il corpo, respirando normalmente, evitando sobbalzi che potrebbero causare artefatti da movimento, con conseguente compromissione della qualità delle immagini.

Controindicazioni

Stato di gravidanza presunta o accertata.

In caso di allattamento è consigliabile la sospensione per alcuni giorni dopo l'esecuzione dell'esame, oppure quando è possibile, rinviare la scintigrafia alla fine dell'allattamento.

Rischi

Gli effetti indesiderati, estremamente rari, con frequenza non nota, possono essere: reazioni di ipersensibilità quali orticaria, brividi, febbre, nausea, eritema facciale e sudorazione, nonché compromissione cardiaca e circolatoria.

Sono state segnalate reazioni anafilattoidi gravi che comprendono shock con possibile effetto fatale. La comparsa di queste reazioni può non essere immediata.

L'esposizione a radiazioni ionizzanti è correlata all'induzione di tumori e a un potenziale sviluppo di difetti ereditari. Tuttavia, la dose somministrata per gli esami diagnostici in medicina nucleare induce una bassa probabilità di insorgenza di questi eventi avversi.

Alternative diagnostiche

La scintigrafia polmonare non sostituisce altre indagini come la ANGIOTAC o Radiografia del Torace.

Essa invece si affianca alle altre metodiche permettendo di valutare la distribuzione della perfusione polmonare.

Precauzioni dopo l'esame

Al termine dell'esame potrà svolgere le normali attività quotidiane (guidare la macchina, lavorare).

E' consigliabile mantenere una buona idratazione per facilitare l'eliminazione del radiofarmaco per via renale.

Si raccomanda di evitare il contatto prolungato con bambini e donne in gravidanza, nelle 24 ore successive all'iniezione del radiofarmaco.

La preghiamo di datare e firmare il presente modulo per presa visione.

Data _____

Firma _____