

## Valutazione rischio caduta pediatrico Scala Humpty Dumpty

rev 0.0 2022

### Dati paziente

Nome \_\_\_\_\_  
 Cognome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_  
 U.O./servizio \_\_\_\_\_  
 Nosologico \_\_\_\_\_

Parametro	Criterio	Data	Data	Data
<b>Età</b>	Inferiore a 3 anni	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Compresa fra 3 anni compiuti e 7 anni meno un giorno	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	Compresa fra 7 anni compiuti e 13 anni meno un giorno	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Da 13 anni in su	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Diagnosi</b>	Problemi neurologici (convulsioni, trauma cranico, idrocefalo, paralisi cerebrale infantile ecc.)	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Disturbi che alterano l'ossigenazione (problemi respiratori, disidratazione, anemia, inappetenza, perdita di coscienza, vertigini ecc.)	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	Patologie neuropsichiatriche o comportamentali (disturbi dell'umore, disturbi del controllo degli impulsi ecc.)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Altre patologie non ricomprese nelle precedenti	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Fattori ambientali</b>	Storia di precedenti cadute; Lattante o bambino fino a 2 anni messo in letto grande anziché in una culla o un lettino.	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Utilizza ausili o ortesi oppure deambulatore, bastone; Lattante o bambino fino a 2 anni messo in culla o in lettino appropriato per l'età; Presenza di pompe o altri dispositivi mobili nella stanza; Scarsa illuminazione nella stanza	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	Bambino di età $\geq 2$ anni collocato in letto appropriato per età	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Bambino assistito fuori dal reparto o in aree aperte al pubblico	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Totale Score</b>			
	<b>Alto rischio se Score &gt; 7</b>			

Data \_\_\_\_\_

Firma Infermiere \_\_\_\_\_